


MERGANETTA

Boletín Informativo de La Sociedad Caldense de Ornitología



Paisaje ganadero con guaduales en los Planes de Neira. Foto JE Botero

LAS AVES DE LOS PLANES DE NEIRA

UNA REGIÓN PRIMORDIALMENTE AGRÍCOLA EN LA PARTE BAJA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES ALBERGA UNA RICA AVIFAUNA

Los Planes de Neira, que no son planes, ni son enteramente en el municipio de Neira sino además en el de Manizales, albergan una interesante avifauna. Así lo indican los resultados de un primer inventario que la SCO ha realizado en semanas pasadas.

Ciento siete especies de aves fueron registradas en observaciones hechas los días 7, 8, 9 y 29 de agosto de 2009, en un primer inventario realizado desde las carreteras que cruzan las fincas de esa región, desde el puente de Pinares, sobre el río Guacaica, hasta la finca Morelia, al otro lado de la quebrada Fonditos, que marca el límite entre Manizales y Neira. Aun falta por estudiar las especies presentes en los guaduales, cañadas y pequeños fragmentos de bosque.

Esta región, situada en el extremo noroccidental del municipio de Manizales, es primordialmente de producción agrícola (cítricos) y ganadera. Cuenta

además con extensas áreas de guaduales, cañadas arborizadas y muchas lagunas artificiales o jagüeyes.

Este inventario inicial de la avifauna de una región antes inexplorada en el municipio de Manizales, permitirá ampliar las listas ya publicadas. Entre las especies observadas sobresalen la Guacamaya Cariseca (*Ara severa*) que fue observada en dos ocasiones, pero que parece haber sido reintroducida en la región, según informa Ramiro Henao. También se registraron otras tres especies de la familia de las loras, cinco especies de garzas y dos de zambullidores. Se vieron Turpiales Montañeros (*Icterus chrysater*) y Sinsontes (*Mimus gilvus*), los cuales han sido exterminados en otras regiones debido a la presión del tráfico ilegal.

Varias ventajas parece tener esa región para las aves. Sería conveniente identificar y promover aquellos factores o características que promueven su conservación en esta zona.



Anatidae (Patos)

Iguasa común - *Dendrocygna autumnalis*

Cracidae (Pavas)

Guacharaca variable - *Ortalis guttata*

Odonthophoridae (Perdices)

Perdiz común - *Colinus cristatus*

Podicipedidae (Zambullidores)

Zambullidor chico - *Tachybaptus dominicus*

Zambullidor común - *Podilymbus podiceps*

Phalacrocoracidae (Cormoranes)

Cormorán neotropical - *Phalacrocorax brasilianus*

Ardeidae (Garzas)

Garza real - *Ardea alba*

Garza azul - *Egretta caerulea*

Garza patiamarilla - *Egretta thula*

Garza rayada - *Butorides striata*

Garcita del ganado - *Bubulcus ibis*

Threskiornithidae (Ibis)

Ibis Coquito - *Phimosus infuscatus*

Cathartidae (Gallinazos)

Gallinazo común - *Coragyps atratus*

Guala - *Cathartes aura*

Pandionidae (Aguila pescadora)

Aguila pescadora - *Pandion haliaetus* *M

Accipitridae (Gavilanes/Aguilas)

Gavilán caminero - *Buteo magnirostris*

Aguililla tijeretas - *Elanoides forficatus*

Falconidae (Halcones)

Caracara - *Caracara (Polyborus) plancus*

Halcón culebrero - *Herpetotheres cachinnans*

Pigua - *Milvago chimachima*

Rallidae (Pollas de agua)

Polla gris - *Gallinula chloropus*

Rascón caucano - *Pardirallus nigricans*

Charadriidae (Pellares)

Caravana - *Vanellus chilensis*

Scolopacidae (Andarríos)

Andarríos solitario - *Tringa solitaria* *M

Jacaniidae (Pollito de ciénaga)

Gallito de ciénaga - *Jacana jacana*

Columbidae (Palomas)

Tortolita diminuta - *Columbina minuta*

Tortolita común - *Columbina talpacoti*

Caminera rabiblanca - *Leptotila verreauxi*

Torcaza morada - *Patagioenas (Columba) cayennensis*

Torcaza nagüiblanca - *Zenaida auriculata*

Psittacidae (Loros)

Lora cebeciamarilla - *Amazona ochrocephala*

Guacamaya cariseca - *Ara severa*

Periquito de anteojos - *Forpus conspicillatus*

Cotorra cabeciazul - *Pionus menstruus*

Cuculidae (Cuclillos/Garrapateros)

Cuclillo rabicorto - *Coccyzus pumila*

Garrapatero común - *Crotophaga ani*

Trés-Piés - *Tapera naevia*

Tytonidae (Lechuzas)

Lechuza común - *Tyto alba*

Apodidae (Vencejos)

Vencejo rabohorcado - *Panyptila cayennensis*

Vencejo collarejo - *Streptoprocne zonaris*

Trochilidae (Colibrís)

Amazilia colirrufo - *Amazilia tzacatl*

Mango pechinegro - *Anthracothorax nigricollis*

Colibrí bufón - *Chalybura buffonii*

Colibrí collarejo - *Florisuga mellivora*

Hermitaño canela - *Glaucis hirsuta*

Alcedinidae (Martín-pescador)

Martín pescador maraquero - *Chloroceryle amazona*

Martín pescador chico - *Chloroceryle americana*

Martín pescador mayor - *Megaceryle torquata*

Bucconidae (Bobos/Monjitas)

Bigotudo canoso - *Malacoptila mystacalis*

Picidae (Carpinteros)

Carpintero buchipecoso - *Colaptes puntigula*

Carpintero de los robles - *Melanerpes formicivorus*

Carpintero habado - *Melanerpes rubicapillus*

Carpinterito punteado - *Picumnus granadensis*

Dentocolaptidae (Trepatroncos)

Trepador campestre - *Lepidocolaptes souleyetii*

Furnaridae (Rastrojeros)

Rastrojero pálido - *Synallaxis albescens*

Rastrojero pizarra - *Synallaxis brachyura*

Thamnophilidae (Batarás)

Batará mayor - *Taraba mayor*

Batará carcajada - *Thamnophilus multistriatus*

Batará plumizo - *Thamnophilus punctatus*

Tyrannidae (Atrapamoscas)

Tiranuelo silbador - *Camptostoma obsoletum*

Elaenia copetona - *Elaenia flavogaster*

Viudita común - *Fluvicula pica*

Atrapamoscas del ganado - *Machetornis rixosus*

Mionectes ocráceo - *Mionectes oleoginea*

Atrapamoscas apical - *Myiarchus apicalis*

Atrapamoscas maculado - *Myiodinastes maculatus*

Suelda crestinegra - *Myiozetetes cayanensis*

Bichofue - *Pitangus sulphuratus*

Titiribi - *Pyrocephalus rubinus*

Guardapuentes - *Sayornis nigricans*

Sirirí común - *Tyrannus melancholicus*

Tijeretas - *Tyrannus savana*

Espatulilla común / Patito - *Todirostrum cinereum*

Espatulilla rastrojera - *Todirostrum sylvia*

Tiranuelo matapalos - *Zimmerius chrysops*

Tityridae (Cabezones)

Cabezón cinéreo - *Pachyrhamphus rufus*

Vireonidae (Verderones)

Verderón ojirrojo - *Vireo olivaceus*

Hirundinidae (Golondrinas)

Golondrina barranquera - *Stelgidopteryx ruficollis*

Troglodytidae (Cucaracheros)

Cucarachero común - *Troglodytes aedon*

Poliptilidae (Currucas)

Curruca tropical - *Poliptila plumbea*

Turdidae (Mirlas)

Mirra parda - *Turdus grayi*

Mayo / Mirra pantanera - *Turdus ignobilis*

Mimidae (Sinsontes)

Sinsonte común - *Mimus gilvus*

Thraupidae (Tángaras y mieleros)

Eufonia gorgiamarilla - *Euphonia lanirostris*

Pintasilgo güira - *Hemithraupis güira*

Asoma terciopelo - *Ramphocelus dimidiatus*

Toche - *Ramphocelus flammigerus*

Tángara real - *Tangara cyanicollis*

Tángara lacrada - *Tangara gyrola*

Tángara rastrojera - *Tangara vitriolina*

Azulejo común - *Thraupis espiscopos*

Azulejo palmero - *Thraupis palmarum*

Incertae sedis (Clasificación incierta)

Mielero común - *Coereba flaveola*

Semillero cariamarillo - *Tiaris olivacea*

Emberizidae (Gorriones)

Sabanero rayado - *Ammodramus humeralis*

Canario costeño - *Sicalis flaveola*

Espiguero ladrillo - *Sporophila minuta*

Negrillo José - *Sporophila nigricollis*

Espiguero pizarra - *Sporophila schistaceus*

Volatinero negro - *Volatinia jacarina*

Cardinalidae (Afines al gorrión)

Saltátor pio-judío - *Saltator striatipectus*

Parulidae (Reinitas)

Arañero cejiblanco - *Basileuterus culicivorus*

Arañero ribereño - *Basileuterus fulvicauda*

Icteridae (Turpiales/Chamones)

Turpial montañero - *Icterus chrysater*

Chamón parásito - *Molothrus bonariensis*

Soldadito - *Sturnella militaris*

Frilingidae (Semilleros)

Jilguero aliblanco - *Carduelis psaltria*

*M: especie migratoria procedente de Norte America.

Esta lista sigue la clasificación taxonómica del Comité Suramericano de Clasificación de la *American Ornithologists' Union (versión enero 2009)*, que difiere en algunos casos del usado por Hilty y Brown en el libro de las aves de Colombia.



Uno de los jagüeyes o estanques que atraen aves acuáticas a la región. Foto JE Botero